




Experiencias de parto en Quito





Al **73%** de las mujeres entrevistadas se le realizaron más **tactos vaginales** que los recomendados (1 cada 4 horas. MSP, 2015)

A más de la mitad (**57%**) con **cesárea previa** (realizada con un mínimo de 2 años) no le dieron la opción de un parto vaginal



Casi la mitad (**49%**) asegura que no tuvieron la opción de tener a su bebé **piel con piel** ni siquiera 5 minutos después de nacer



Al **22%** de las madres que fueron separadas de su bebé en el postparto, no se les **informó** la razón de la separación



El **35%** asegura que no se le ofreció ayuda para iniciar la **lactancia materna** después de haber dado a luz


Acompañamiento

¿El personal de salud le permitió estar acompañada por una o más personas de su elección durante el parto/cesarea?



Episiotomía


¿Le realizaron el procedimiento de corte en la zona vaginal? (Episiotomía)



***Dato en mujeres primiparas.**

Posición al dar a luz

¿Fue posible escoger la posición que usted deseaba?



Violencia obstétrica

¿Había usted oído hablar de violencia obstétrica?


Este documento es resultado de la investigación:

Experiencias de mujeres atendidas en los servicios de salud pública del MSP, del Distrito Metropolitano de Quito, durante su embarazo, parto y postparto.

UDLA/EPEN (2016/2017).

Entrevistadas en puerperio inmediato y mediato de partos de bajo riesgo

VIOLENCIA OBSTÉTRICA



REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÉDICOS RUTINARIOS

Abuso de tactos, prohibición de ingerir líquidos y alimentos, suero intravenoso, monitoreo continuo, aceleración del parto, ruptura de membranas, pujo dirigido, episiotomía, corte temprano del cordón o masaje para que salga la placenta.



Recibir un trato digno y amable

• Aceptar o negarse a recibir un tratamiento

Recibir información comprensible y veraz de su estado de salud y el de su bebé

• Comer, beber y usar su ropa durante la labor de parto

Moverse libremente y dar a luz en la posición que usted prefiera

• Mostrar emociones: gritar, llorar, reírse



Intentar un parto vaginal, incluso si tiene una cesárea previa


• Corte tardío del cordón umbilical

Que le entreguen su placenta si usted lo desea


• Tener a su bebé sano sobre su pecho, al menos en la primera hora de vida

A la lactancia materna inmediata y a recibir ayuda adecuada

• Al alojamiento conjunto con su bebé




Violencia obstétrica es un tipo de violencia de género que afecta a la mujer, su bebé y acompañante.



Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, lo que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación.

En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud. Esto no sólo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación.

(Organización Mundial de la Salud, 2014)



CONOCE Y EXIGE

TUS DERECHOS

EN EL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO